

レジメン名	催吐リスク
乳がん EC	高度

適応	乳がん（術前・術後補助化学療法、転移・再発）				
投与期間	3週間を1コースとして、4コース				
	薬品名	投与量	投与ルート	投与時間	備考
	イメドカプセル125mg	1日1回	内服		抗がん剤点滴開始1～1.5時間前に服用
①	アロキシ静注0.75mg +デカドロン注6.6mg 2V		点滴	15分	
②	ファルモルピシン注（エピルピシン） 生食50mL	90mg/m ²	点滴	15分	
③	エンドキサン注 生食100mL	600mg/m ²	点滴	30分	
④	生食 50mL		点滴	15分	
	イメドカプセル80mg	1日1回	内服		Day 2～3 の 午前中

投与スケジュール

薬品名	Day	1	2	3	4	...	6	7	...	13	14	...	20	21	22	23	24	25	26	...	
イメド 125mg		↓													↓						
ファルモルピシン		↓													↓						
エンドキサン		↓													↓						
イメド 80mg			↓	↓												↓	↓				

day1

イメドカプセル125mg 内服（抗がん剤点滴1～1.5時間前）

①アロキシ+デカドロン （15分）

②ファルモルピシン 15分

③エンドキサン注 30分

④生食50mL 15分

day2～3

イメドカプセル80mg 内服（午前中）

減量規定及び中止基準

grade3以上の有害事象（80% dose down）

EPIの総投与量が900mg/m²を超える場合（心毒性に注意）