

レジメン名	催吐リスク
大腸がん FOLFIRI + アービタックス（アービタックス毎週）	中等度

適応	切除不能な進行・再発の 結腸・直腸がん				
投与期間	2週間を1コースとして、不応になるまで継続				
	薬品名	投与量	投与ルート	投与時間	備考
①	グラニセトンバッグ® 3mg(1mgでも可) +デカドロン注6.6mg 1~2V +ポラミン注5mg 2A		点滴	30分	Day 1,15
	ポラミン注 2A 生食50mL		点滴	5分	Day8,22
②	【初回】セツキシマブ 生食500mL	初回400mg/m ²	点滴	2時間	週1回
	【2回目以降】セツキシマブ 生食250mL	2回目以降 250mg/m ²	点滴	1時間	
③	イリノテカン（CPT-11） 5%ブドウ糖液250mL	150mg/m ²	④と同時に点滴	2時間	2週に1回
④	レボホリナート（I-LV） 5%ブドウ糖液250mL	200mg/m ²	③と同時に点滴	2時間	
⑤	5-FU (bolus) 5%ブドウ糖液50mL	400mg/m ²	全開で投与	5分程度	
⑥	5-FU(46h) 生食にて計115mL	2400mg/m ²	インフューザー・ポンプ®	46時間	

投与スケジュール

薬品名	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
セツキシマブ		↓							↓							↓							↓
イリノテカン		↓														↓							
レボホリナート		↓														↓							
5-FU(bolus)		↓														↓							
5-FU(46h)		↓	→													↓	→						

Day1 or 15

①グラニセトン+デカドロン+ポラミン（30分）

②セツキシマブ ※1

③イリノテカン 2時間 ※同時投与

④レボホリナート 2時間

⑤5-FU (bolus) 全開

⑥5-FU (46h) インフューザー・ポンプ®で46時間

Day8 or 22

①ポラミン+生食（5分）

②セツキシマブ ※1 セツキシマブ注のと投与時間：初回2時間、2回目以降1時間

減量規定及び中止基準

- ・RAS変異型には無効
- ・FOLFIRIのみでも可
- ・Grade4以上の有害事象、Grade3以上の血液毒性出現、FOLFIRI 80%doseにdown