

レジメン名	催吐リスク
大腸がん SOX+Beva	中等度

適応	切除不能な進行・再発の 結腸・直腸がん				
投与期間	3週間を1コースとして、不応になるまで継続				
	薬品名	投与量	投与ルート	投与時間	備考
①	グラニセトロンバッグ <sup>®</sup> 3mg(1mgでも可) +デカドロン注6.6mg 1~2V		点滴	30分	
②	ベバシズマブ (Beva) 生食100mL	7.5mg/kg	点滴	※1	
③	オキサリプラチン (L-OHP) 5%ブドウ糖液250mL	130mg/m <sup>2</sup>	点滴	2時間	
④	S-1	※下記用量	内服	2週間服用 1週間休薬	Day1の夕食後から開始

※1 アバスチン注の投与時間：初回90分 2回目：60分 3回目以降：30分まで短縮可能

※ S-1投与量

体表面積

用量

1.25m<sup>2</sup>未満 40mg/回 × 2回/日

1.25~1.5m<sup>2</sup> 50mg/回 × 2回/日

1.5m<sup>2</sup>以上 60mg/回 × 2回/日

投与スケジュール

薬品名	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
ベバシズマブ		↓																					
オキサリプラチン		↓																					
S-1		↓ 夕	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓ 朝	休薬						

Day1

①グラニセトロン+デカドロン (30分)

②ベバシズマブ ※1

③オキサリプラチン 2時間

④S-1 Day1夕~Day15朝まで

減量規定及び中止基準

Grade 3 以上で減量

オキサリプラチン 1回目発現時：100mg/m<sup>2</sup>に減量

2回目発現時：85mg/m<sup>2</sup>に減量