

| レジメン名 | 催吐リスク |
|---------------------|-------|
| 大腸がん TAS-102 + Beva | 中等度 |

| 適応 | 切除不能な進行・再発の 結腸・直腸がん 3次治療以降 | | | | |
|------|---|----------------------------------|-------|----------|---------|
| 投与期間 | 週'5日内服、2日休薬を2週間継続、次の2週間は休薬という4週を1コースとして、不応になるまで継続 | | | | |
| | 薬品名 | 投与量 | 投与ルート | 投与時間 | 備考 |
| ① | ペバシズマブ (Beva) 生食100mL | 5mg/kg | 点滴 | ※1 | day1,15 |
| ① | ロンサーフ配合錠 | 70mg/m ² /日 (下記参照) | 内服 | 1日2回 朝・夕 | ※2 |
| | | | | | |

※1 初回90分、2回目60分、問題無ければ3回目以降30分まで短縮可能

ロンサーフ配合錠

体表面積

用量

| | |
|----------------------------|------------------|
| 1.07m ² 未満 | 35mg/回 (70mg/日) |
| 1.07~1.23m ² 未満 | 40mg/回 (80mg/日) |
| 1.23~1.38m ² 未満 | 45mg/回 (90mg/日) |
| 1.38~1.53m ² 未満 | 50mg/回 (100mg/日) |
| 1.53~1.69m ² 未満 | 55mg/回 (110mg/日) |
| 1.69~1.84m ² 未満 | 60mg/回 (120mg/日) |
| 1.84~1.99m ² 未満 | 65mg/回 (130mg/日) |
| 1.99~2.15m ² 未満 | 70mg/回 (140mg/日) |
| 2.15m ² 以上 | 75mg/回 (150mg/日) |

投与スケジュール

| 薬品名 | Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ... | 20 | 28 |
|----------|-----|----|---|---|---|---|-----|----|----|---|----|----|----|-----|----|----|-------|----|----|-----|----|----|
| アバスタチン | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | ↓ | 2週間休薬 | | | | | |
| ロンサーフ配合錠 | | 夕↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 朝まで | 休薬 | 夕↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 朝まで | 休薬 | 休薬 | | | | | | |

※2 Day1の夕食後から服用開始した場合：Day6の夕から休薬。Day8は夕食後から服用。
Day1夕に薬を服用出来ない場合：Day2の朝～Day6の夕まで服用、Day7、8を休薬

減量規定及び中止基準

Grade 3 以上で減量とする
コース単位で1日単位量として 10mg/日単位で減量
ただし最低投与量は30mg/日