

レジメン名	催吐リスク
大腸がん TAS-102	中等度

適応	切除不能な進行・再発の 結腸・直腸がん 3次治療以降				
投与期間	週'5日内服、2日休薬を2週間継続、次の2週間は休薬という4週を1コースとして、不応になるまで継続				
	薬品名	投与量	投与ルート	投与時間	備考
①	ロンサーフ配合錠	※下記用量	内服	1日2回 朝・夕	

※1 ロンサーフ配合錠

体表面積

用量

1.07m ² 未満	35mg/回 (70mg/日)
1.07~1.23m ² 未満	40mg/回 (80mg/日)
1.23~1.38m ² 未満	45mg/回 (90mg/日)
1.38~1.53m ² 未満	50mg/回 (100mg/日)
1.53~1.69m ² 未満	55mg/回 (110mg/日)
1.69~1.84m ² 未満	60mg/回 (120mg/日)
1.84~1.99m ² 未満	65mg/回 (130mg/日)
1.99~2.15m ² 未満	70mg/回 (140mg/日)
2.15m ² 以上	75mg/回 (150mg/日)

投与スケジュール

薬品名	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	...	20	28
ロンサーフ配合錠		↓	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	↓	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	2週間休薬						

※Day1の夕食後から服用開始した場合：Day6の夕から休薬。Day8は夕食後から服用。

減量規定及び中止基準

Grade 3 以上で減量とする
 コース単位で1日単位量として 10mg/日単位で減量
 ただし最低投与量は30mg/日