

レジメン名	催吐リスク
大腸がん mFOLFOX6 + アービタックス (アービタックス隔週)	中等度

適応	切除不能な進行・再発の 結腸・直腸がん
投与期間	2週間を1コースとして、不応になるまで継続

	薬品名	投与量	投与ルート	投与時間	備考
①	グラニセトロンバッグ 3mg(1mgも可) +デカドロン注6.6mg 1~2V +ポラミン注5mg 2A		点滴	30分	
②	セツキシマブ 生食500mL	500mg/m ²	点滴	※1	
③	オキサリプラチン (L-OHP) 5%ブドウ糖液250mL	85mg/m ²	④と同時に点滴	2時間	
④	レボホリナート (1-LV) 5%ブドウ糖液250mL	200mg/m ²	③と同時に点滴	2時間	
⑤	5-FU (bolus) 5%ブドウ糖液50mL	400mg/m ²	全開で投与	5分程度	
⑥	5-FU(46h) 生食にて計115mL	2400mg/m ²	インフューザーポンプ ^o	46時間	

※1 初回：2時間 2回目：90分 3回目以降60分まで短縮可能

投与スケジュール

薬品名	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
セツキシマブ		↓														↓							
オキサリプラチン		↓														↓							
レボホリナート		↓														↓							
5-FU(bolus)		↓														↓							
5-FU(46h)		↓	→													↓	→						

①グラニセトロン+デカドロン+ポラミン (30分)

②セツキシマブ ※1

③オキサリプラチン 2時間

④レボホリナート 2時間 ※同時投与

⑤5-FU (bolus) 全開

⑥5-FU (46h) インフューザーポンプ^oで46時間

減量規定及び中止基準

- ・RAS変異型には無効
- ・mFOLFOX6のみでも可
- ・末梢神経障害強いつきはL-OHPを中止する
- ・Grade4以上の有害事象、Grade3以上の血液毒性出現、mFOLFOX6 80%doseにdown