

レジメン名	催吐リスク
大腸がん mFOLFOX6 + アービタックス (アービタックス毎週)	中等度

適応	切除不能な進行・再発の 結腸・直腸がん				
投与期間	2週間を1コースとして、不応になるまで継続				
	薬品名	投与量	投与ルート	投与時間	備考
①	グラニセトロンバッグ 3mg(1mgでも可) +デカドロン注6.6mg 1~2V +ポラミン注5mg 2A		点滴	30分	Day1,15
	ポラミン注5mg 2A 生食50mL		点滴	5分	Day8,22
②	【初回】セツキシマブ 生食500mL	初回400mg/m <sup>2</sup>	点滴	2時間	週1回
	【2回目以降】セツキシマブ 生食250mL	2回目以降 250mg/m <sup>2</sup>	点滴	1時間	
③	オキサリプラチン (L-OHP) 5%ブドウ糖液250mL	85mg/m <sup>2</sup>	④と同時に点滴	2時間	2週に1回
④	レボホリナート (1-LV) 5%ブドウ糖液250mL	200mg/m <sup>2</sup>	③と同時に点滴	2時間	
⑤	5-FU (bolus) 5%ブドウ糖液50mL	400mg/m <sup>2</sup>	全開で投与	5分程度	
⑥	5-FU(46h) 生食にて計115mL	2400mg/m <sup>2</sup>	インフューザーポンプ	46時間	

### 投与スケジュール

薬品名	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
セツキシマブ		↓							↓							↓							↓
オキサリプラチン		↓														↓							
レボホリナート		↓														↓							
5-FU(bolus)		↓														↓							
5-FU(46h)		↓	→													↓	→						

### Day1 or 15

①グラニセトロン+デカドロン+ポラミン (30)

②セツキシマブ ※1

③オキサリプラチン 2時間

④レボホリナート 2時間 ※同時投与

⑤5-FU (bolus) 全開

⑥5-FU (46h) インフューザーポンプで46時間

### Day8 or 22

①ポラミン+生食 (5分)

②セツキシマブ ※1

※1 セツキシマブ: 初回2時間、2回目以降1時間

### 減量規定及び中止基準

- ・RAS変異型には無効
- ・mFOLFOX6のみでも可
- ・末梢神経障害強いときはL-OHPを中止する
- ・Grade4以上の有害事象、Grade3以上の血液毒性出現、mFOLFOX6 80%doseにdown