

レジメン名	催吐リスク
大腸がん セツキシマブ + CPT-11 (毎週)	中等度

適応	切除不能な進行・再発の 結腸・直腸がん				
投与期間	2週を1コース（セツキシマブは毎週）として、不応まで継続				
	薬品名	投与量	投与ルート	投与時間	備考
①	グラニセロンバッグ3mg+デカドロン注6.6mg+ポララミン注5mg	デカドロン：1～2V ポララミン：2A	点滴	30分	Day1、15
	ポララミン注5mg + 生食100mL (※生食50mLでも可)	ポララミン：2A	点滴	5分	Day8、22
②	【初回】セツキシマブ 生食500mL	初回400mg/m ²	点滴	2時間	初回
	【2回目以降】セツキシマブ 生食250mL	2回目以降 250mg/m ²	点滴	1時間	2回目以降
③	イリノテカン（CPT-11） 5%ブドウ糖液250mL	150mg/m ²	点滴	90分	Day1、15

投与スケジュール

薬品名	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
セツキシマブ		↓							↓							↓							↓
イリノテカン		↓														↓							

Day1 or 15

①グラニセロン+デカドロン+ポララミン (30分)

②セツキシマブ ※1

③イリノテカン 90分

Day8 or 22

①ポララミン+生食 (5分)

②アービタックス ※1

※1 セツキシマブ：初回2時間 2回目以降は1時間

減量規定及び中止基準

CPT-11不可の場合、セツキシマブ単独でも可
他、添付文書に準ずる