

レジメン名	催吐リスク
胃がん SOX+ハーセプチン	中等度

適応 切除不能な進行・再発の 胃がん（HER2陽性） 一次治療

投与期間 3週間を1コースとして、不応になるまで継続

	薬品名	投与量	投与ルート	投与時間	備考
①	ハーセプチン 生食250mL	8mg/kg	点滴	90分	初回
		6mg/kg		30分	2回目以降
②	グラニセロンバッグ [®] 3mg(1mgでも可) +デカドロン注6.6mg 1~2V		点滴	30分	
③	エルプラット (L-OHP) 5%ブドウ糖液250mL	130mg/m ² ※1	点滴	2時間	
④	TS-1	※下記用量	内服	2週間服用 1週間休薬	Day1の夕食後 から開始

※1 標準的投与量：G-SOX試験では100mg/m² HIGHSOX試験(SOX+T-mab)では130mg/m²

※ TS-1投与量

体表面積

用量

1.25m ² 未満	40mg/回 × 2回/日
1.25~1.5m ²	50mg/回 × 2回/日
1.5m ² 以上	60mg/回 × 2回/日

投与スケジュール

薬品名	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ハーセプチン		↓																				
エルプラット		↓																				
TS-1		↓ 夕	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓ 朝	休薬					

Day1

①ハーセプチン（初回90分、2回目以降30分）

②グラニセロン+デカドロン 30分

③エルプラット 2時間

④TS-1 Day1夕~Day15朝まで

減量規定及び中止基準

Grade 3 以上で減量

オキサリプラチン 1回目発現時：75mg/m²に減量
2回目発現時：50mg/m²に減量